# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 25 - 7 - 83209147
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE =

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE LAGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL

ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de recettes de la D.D.A

C.C.P Montpellier 5238-57

N° 15bis - 21 JUILLET 83-

SPECIAL PYRENEES ORIENTALES

#### PECHER

## COCHENILLE BLANCHE DU MURIER :

Le début d'essaimage important a été observé à la fin de la semaine dernière. Le traitement est à effectuer dès réception du présent avis à l'aide de méthidathion (40 g. m;a./hl), et mévinphos (50 g m.a./hl), diéthion et méthomyl peuvent également être utilisés.

Il est nécessaire de bien mouiller les charpentières, et l'ensemble de la végétation.

Ce traitement sera renouvelé sous quinzaine.

#### TOUTES ESSENCES

#### POU DE SAN JOSE (2ème génération)

Un traitement est préconisé dès réception dans les vergers atteints par cette redoutable cochenille dont l'essaimage est constaté actuellement.

Méthidathion (40 g m.a./hl), mévinphos (50 g m.a./hl) sont préconisés. Il sera renouvelé sous quinzaine.

L'olioparathion ne sera pas utilisé sur pêcher, mais sur autres essences.(22,5 g m.a./hl).

### RESPECTER STRICTEMENT LES DELATS D'EMPLOI AVANT RECOLTE :

- méthidathion

15 jours

- diéthion

15 jours

- mévinphos

7 jours

- méthomy1

7 jours

SUR ARBRES EN COURS DE CUEILLETTE, NE TRAITEZ QU'APRES RECOLTE.

Tirage du 21 juillet 1983 - 120 exemplaires (c) Bulletin Technique des Avertissements Agricoles - MONTPELLIER 1983

P 443